

VACUNACIÓN COVID EN EMBARAZADAS Y LACTANCIA

Consideraciones para su vacunación

- 1- Las embarazadas tienen el mismo riesgo, o mayor, de enfermedad grave por COVID-19 que las pacientes no embarazadas.
- 2- La lesión placentaria por SARS-CoV2 puede provocar muerte fetal
- 3- Se ha documentado la transmisión vertical del SARS-CoV-2 al feto
- 4- Mayor riesgo de parto prematuro
- 5- **Importancia de la vacunación:**
 - a- Las vacunas COVID-19 ofrecen a las embarazadas la mejor protección contra la enfermedad, que puede ser grave en el embarazo
 - b- Previenen enfermedad severa
 - c- Transferencia de anticuerpos al RN a través de la placenta
 - d- Potencial protección a través de la lactancia
 - e- Al ser Covid-19 una enfermedad grave en la embarazada, la vacunación y evitar la exposición al virus, constituyen las medidas preventivas más eficaces

Indicaciones de vacunación

- 1- Embarazadas de grupos de riesgo (febrero 2021) (factores de riesgo- riesgo de exposición)
- 2- Embarazadas o en periodo de lactancia sin factores de riesgo o de exposición:
 - a. Se evaluará los riesgos y beneficios por parte del profesional tratante
 - b. Se considerará la aceptación de la embarazada o en periodo de lactancia de aplicarse la vacuna
 - c. Deberá presentar la prescripción médica de vacunación
 - d. Al momento de la vacunación se puede ofrecer, de ser posible por disponibilidad, vacuna COVID19 diferente de AstraZeneca-COVISHIELD- Si no fuera posible otra alternativa, no se deberá retrasar la vacunación y se aplicará la 1ra dosis de AstraZeneca-COVISHIELD (Recomendaciones nacionales- MSN)
 - e. La primera dosis de la vacuna brindará protección, la segunda protección duradera. No es necesario retrasar la 2da dosis

Fuentes:

Recomendaciones para la atención de la embarazadas y RN en el contexto de pandemia - MSN - 16/junio/2021

Recommendation on the use of COVID-19 Vaccines. National Advisory Committee on Immunization (NACI) 17/junio/2021

Covid 19 Vaccination in pregnant. - Public Health England 14/junio/2021