



OBSERVATORIO DE SALUD
MEDICAMENTOS Y AMBIENTE
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS CÓRDOBA



El Observatorio de Salud, Medicamentos y Ambiente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba quiere compartir estas indicaciones acerca de la aplicación de la vacunación antigripal y antineumocócica en contexto de vacunación contra COVID-19.

Recomendaciones:

- 1 - En todos los casos se debe transmitir a los pacientes la importancia de la vacunación contra la COVID-19. Si reciben notificación de fecha de vacunación de COVID diferir la vacunación antineumocócica y/o antigripal y priorizar COVID-19.
- 2 - En caso de haber recibido esquema completo para COVID, sugerimos esperar 15 días para efectuar la vacunación antigripal y/o antineumocócica (que pueden darse juntas).
- 3 - En caso de haber recibido la primera dosis contra COVID-19 recomendamos esperar a recibir la segunda dosis contra la COVID-19, 15 días para la vacunación antigripal y/o antineumocócica.
- 4 - Si el paciente está en lista de espera sin fecha definida para vacuna contra COVID-19, aconsejamos reciba la vacunación antineumocócica y/o antigripal.
- 5 - Si recibieron la vacuna antigripal y reciben la notificación para vacunarse para COVID-19, diferir esta vacunación para dejar un espacio de 15 días entre vacunaciones, a fin de permitir el monitoreo de efectos adversos, siempre que sea posible. En caso contrario, proceder con ambas vacunaciones.

Es importante destacar que estas orientaciones son indicativas, respetándose siempre el criterio del personal de salud tratante y de las autoridades de cada jurisdicción, en relación a la situación de cada paciente.

ÁREA DE CAPACITACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS CÓRDOBA
CORRO 146, CÓRDOBA

www.colfacor.org.ar
formacion@colfacor.org.ar







En relación a la vacunación antineumococcica, se comparte el siguiente esquema de vacunación y se recuerda que la vacuna antineumocócica (VCN13 o VCN23) y la vacuna antigripal pueden aplicarse simultáneamente pero en lugares anatómicos diferentes.

Esquemas de vacunación en personas mayores de 65 años

1. Personas ≥ 65 años que nunca recibieron vacunas contra neumococo



2. Personas ≥ 65 años que recibieron previamente VPN23 a los 65 años o más



3. Personas ≥ 65 años que recibieron VPN23 antes de los 65 años



Fuente: Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

